


4.1 Convulsiones



(1) Convulsiones son movimientos involuntarios del cuerpo. Pueden ser movimientos de solo partes específicas del cuerpo (convulsiones focales) o movimientos de todo el cuerpo con pérdida de conciencia (convulsiones generalizadas). Comúnmente los testigos describen los movimientos como "temblores." Luego de una convulsión generalizada el paciente puede presentar un periodo de pérdida de conocimiento o de confusión (periodo post-ictal). Éste puede durar minutos hasta horas.

(2) Pacientes embarazadas que desarrollan hipertensión y convulsiones durante el 3er trimestre se conoce como **Eclampsia**. El tratamiento definitivo para esta condición es terminar el embarazo mediante cesárea por lo que la paciente debe ser transportada a un hospital con disponibilidad de ginecólogos y sala de operaciones.

(3) Clonidine (Catapress) es el tratamiento de elección PO para pacientes con **Eclampsia**. En dosis de 0.2mg hasta un máximo de 3 dosis (0.6mg). El Normodyne (labetalol) es el tratamiento de elección IV para pacientes con Eclampsia. Se puede administrar una dosis inicial de hasta 20mg IV **lentamente** a bajar en infusión de 2 minutos, siempre y cuando la paciente no presente **dificultad respiratoria, bradicardia, ni signos de CHF**.