


## 5.5 Toxidromo de Opiáceos (1)



(1) Opiáceos - medicamentos o sustancias químicas que actúan a nivel del sistema nervioso central estimulando receptores opioides y producen sedación y analgesia.

(2) Algunos de los opiáceos más comunes son Heroína, Morfina, Metadona, Percocet, Darvocet, Codeína, Vicodin, clonidina (en niños), entre otros. Signos y síntomas más comunes de utilización de opiáceos son: miosis (pupilas contraídas), piloerección, somnolencia o letargia, depresión respiratoria, hipoventilación e hipoxemia, hipotensión, edema pulmonar repentino.

(3) La indicación para Narcan es depresión respiratoria. El objetivo es mejorar las respiraciones, NO despertar al paciente. Dosis excesivas de Narcan pueden tornar al paciente agresivo, con síntomas de retirada de opiáceos y pueden presentar convulsiones.

(4) El Narcan puede ser administrada vía Intra-Muscular (IM) Intra-Nasal (IN) Intra-Venosa (IV) o Subcutánea (SQ) en dosis de 0.4mg hasta 4mg sin exceder a 10mg. La vía intranasal se utilizara solamente en pacientes que sean de difícil acceso venoso o con historial de uso y abuso de drogas ilícitas intravenosas.

**Revisado 10/2016**